

2. Bansal VK, Beto JA. Treatment of lupus nephritis: a meta-analysis of clinical trials. *Amer J Kidney Dis* 1997; 29; 2: 193–199.
3. Boumpas DT, Austin HA, Vaughn EM, et al. Controlled trial of pulse methylprednisolone versus two regimens of pulse cyclophosphamide in severe lupus nephritis. *The Lancet* 1992; 340: 741–745.
4. Castier MB, Albuquerque EMN, Menezes MEF, et al. Cardiac Tamponade in Systemic Lupus Erythematosus. Report of Four Cases. *Arq Bras Cardiol* 2000; 75; 5: 446–448.
5. Cely C, Stollman NH. Lupus abdominal crisis owing to rupture of an ileocolic aneurysm with successful angiographic treatment. *J Clin Gastroenterol* 2001; 32; 4: 347–350.
6. Hayslett JP, Esdaile JM. Response to therapy as a predictor of outcome in lupus. *Clin and Invest Med* 1992; 15; 4: 145.
7. Illei GG, Austin HA, Crane M, et al. Combination therapy with pulse cyclophosphamide plus pulse methylprednisolone improves long-term renal outcome without adding toxicity in patients with lupus nephritis. *Ann Intern Med* 2001; 135; 4: 296–298.
8. Mok CC, Lau CS, Chan EYT, et al. Acute transverse myelopathy in SLE: Clinical Presentation, Treatment and outcome. *J of Rheumatol* 1998; 25; 3: 467–473.
9. Mok CC, Lau CS, Wong RW. Neuropsychiatric manifestations and their clinical associations in southern chinese patients with systemic lupus erythematosus. *J Rheumatol* 2001; 28; 4: 766–771.
10. Mok CC, Ho CT, Sin YP, et al. Treatment of diffuse proliferative lupus glomerulonephritis: a comparison of two cyclophosphamide-containing regimens. *Am J Kidney Dis* 2001; 38; 2: 256–264.
11. Mosca M, Neri R, Gianessi S, et al. Therapy with pulse methylprednisolone and short-course pulse cyclophosphamide for diffuse proliferative glomerulonephritis. *Lupus* 2001; 10; 4: 253–257.
12. Paton NJ, Cheong IKS, Kong NCT, et al. Risk factors for infections in Malaysian patients with SLE. *Q J Med* 1996; 89: 531–538.
13. Pinto LF, Senior JM, Ceron JA, et al. Nefropatia lupica. *Acta Medica Colombiana* 1992; 18; 3: 157–163.
14. Robert E, Parodi A, Rebora A. An Unusual Dermatologic Presentation of Systemic Lupus Erythematosus. *Int J Dermatol* 1992; 31; 2: 14.

Частичная или полная отмена циклоспорина у больных после трансплантации почки на фоне назначения ММФ (селлсепта)

М.М. Каабак, Ж.И. Куракина

Российский научный центр хирургии Российской академии медицинских наук

Partial or complete cyclosporine withdrawal conveyed with MMF (Cellcept) administration in kidney allograft recipients

М.М. Kaabak, J.I. Kurakina

Ключевые слова: хроническая трансплантационная нефропатия, циклоспорин, ММФ (селлсепт).

У 20 реципиентов почечных аллотрансплантатов было осуществлено постепенное снижение дозы циклоспорина ниже терапевтического диапазона на фоне назначения ММФ (селлсепта). Всем больным перед началом отмены циклоспорина выполнялась пункционная биопсия трансплантата, которая у шести больных выявила отсутствие патологии, у остальных – разнообразные патологические изменения. Срок наблюдения за больными после более чем двукратного снижения дозы циклоспорина составил $14,6 \pm 3,4$ мес. Обнаружены увеличение скорости клубочковой фильтрации ($p < 0,05$) и снижение артериального давления ($p < 0,01$).

In 20 kidney allograft recipients, cyclosporine dosage was gradually reduced below «therapeutic window» conveyed MMF administration. Before starting cyclosporine withdrawal, graft biopsy was performed and revealed normal picture in 6 patients and different pathological findings in the rests. Follow up duration after more then two fold decrease in cyclosporine dosage was $14,6 \pm 3,4$ months. A statistically significant increase in glomerular filtration rate ($p < 0,05$) and a decrease in the blood pressure ($p < 0,01$) were found.

Приблизительно 20 лет тому назад циклоспорин появился как иммуносупрессивный агент для предупреждения отторжения трансплантированной ткани. Однолетняя выживаемость почечного трансплантата теперь составляет около 90% в сравнении с 60% в 1980 году – до начала применения циклоспорина. Однако за последние 20 лет отдаленная выживаемость транс-

плантата не улучшилась из-за действия ряда иммунных и неиммунных факторов, ведущих к дополнительному поражению почки. Эти факторы включают и само по себе использование циклоспорина, известного своей нефротоксичностью.

Нефротоксические эффекты циклоспорина приводят к обратимым и необратимым изменениям.

Циклоспорин вызывает спазм сосудов, особенно аферентных артериол, это ведет к падению почечного кровотока и скорости клубочковой фильтрации, повышению реноваскулярного сопротивления и снижению плазменного клиренса мочевой кислоты. Эти изменения носят дозозависимый и обратимый характер даже после длительного лечения циклоспорином. Циклоспориновую нефротоксичность, зачастую, трудно диагностировать из-за одновременного наличия поражения почки, вызванного клубочковой гиперфильтрацией и хроническим отторжением.

Хроническая нефропатия трансплантата – главное препятствие отдаленного выживания трансплантационной почки. За последние несколько лет появились новые схемы иммуносупрессии, не обладающие нефротоксическим действием. Они включают препарат ММФ (селлсепт) – ингибитор пролиферации Т- и В-лимфоцитов. ММФ оказывает более сильное иммуносупрессивное действие, чем азатиоприн, при сходном уровне токсичности. Хотя ММФ существенно снижает частоту острого отторжения, оценить его влияние на отдаленное выживание трансплантата труднее. Несколько клинических исследований других новых препаратов (рапамицина, блокаторов рецепторов интерлейкина-2) также выявили достоверное уменьшение частоты острого отторжения аллотрансплантата почки. Однако до настоящего времени не удавалось продемонстрировать статистически достоверное улучшение отдаленных результатов. Вероятно, невозможность выявить такое преимущество вызвана небольшим числом изученных пациентов и недостаточным сроком наблюдения.

Помимо доказанного положительного влияния ММФ на острое отторжение, экспериментальные и клинические исследования позволяют предполагать, что он имеет дополнительные преимущества, которые могут сглаживать течение хронической нефропатии трансплантата.

Эффективность и безопасность этого препарата в комбинации с малыми дозами циклоспорина и кортикостероидами была изучена в ряде клинических исследований. В частности анализ Европейского клинического исследования по применению ММФ для профилактики острого отторжения [1] продемонстрировал статистически недостоверную тенденцию к небольшому улучшению трехлетней выживаемости больных, получавших ММФ в дозе 2–3 г/сут (81,2% и 84,8% соответственно) по сравнению с теми, кто получал плацебо (78%, $p = 0,12$). При проведении последующего анализа показатели гибели трансплантата через 3 года (исключая случаи смерти самих пациентов) показывали на благоприятный эффект ММФ (13,2% в группе ММФ в дозе 2 г/сут и 22% в группе плацебо, $p = 0,03$).

Проведенный в США на популяции в 66 774 больных анализ поздней гибели трансплантата по Каплану–Майеру (с исключением случаев смерти пациентов) показал, что при лечении ММФ 4-летнее выживание трансплантатов было достоверно лучше, чем при лечении азатиоприном (85,6% и 81,9% соответственно, $p < 0,0001$). Анализ выживания пациентов по Каплану–Майеру в сроки больше 6 месяцев после трансплантации продемонстрировал лучшее 4-летнее выживание при лечении ММФ по сравнению с таковым при лечении

азатиоприном (91,4% и 89,8%, $p = 0,002$) [2].

Мировой опыт снижения дозы циклоспорина на фоне назначения ММФ в настоящее время невелик. В доступной нам литературе мы нашли три публикации на эту тему. В каждой из работ отмена циклоспорина производилась у небольшого числа пациентов – от 12 до 17. Общее количество больных – 46. Ниже приводится краткое описание этих работ.

Schrana и соавторы (2000 г.) проанализировали группу из 17 больных со сниженной функцией почки (не менее 6 месяцев после трансплантации) [3]. После начала приема ММФ в дозе 1 грамм 2 раза в сутки дозу циклоспорина снижали от стандартной до низкой (медиана минимальных концентраций соответственно 130 мкг/л и 45 мкг/л) с последующей полной отменой. Терапия преднизолоном продолжалась (7,5 мг/сут).

На этапе снижения дозы циклоспорина у одного пациента развилась диарея, потребовавшая отмены ММФ и возвращения прежней дозы циклоспорина. У другого пациента также на этапе снижения дозы циклоспорина развилось острое отторжение, купированное стероидами. Прием ММФ был прекращен, и доза циклоспорина возвращена к исходной, после чего функция почки восстановилась.

Полная отмена циклоспорина была произведена у 15 больных и сопровождалась снижением среднесуточного систолического АД с 152 ± 13 до 145 ± 13 мм рт. ст. ($p < 0,01$), диастолического АД с 93 ± 9 до 89 ± 12 мм рт. ст. ($p < 0,05$), повышением скорости клубочковой фильтрации с $46,6 \pm 8,8$ до $58 \pm 10,5$ мл/мин ($p < 0,01$). Наблюдение за больными продолжалось в течение трех лет. Двое больных прекратили прием ММФ через год после полной отмены циклоспорина, один из-за развития саркомы Капоши, другой из-за рецидивирующих инфекций.

Было отмечено, что отмена циклоспорина не привела к отрицательным последствиям, более того, постепенная замена циклоспорина на ММФ безопасна и в большинстве случаев эффективна: она положительно влияет на артериальное давление, клубочковую гемодинамику и липидный профиль. Также было отмечено снижение частоты сердечно-сосудистых заболеваний.

Houde и соавторы (2000 г.) в своем исследовании описали результаты лечения 17 взрослых пациентов, перенесших трансплантацию почки, которых из-за нефротоксического действия циклоспорина, обнаруженного при биопсии (атрофия канальцев, гиалиноз артериол), перевели со схемы иммуносупрессии, включавшей циклоспорин А и преднизолон, на сочетание ММФ и преднизолона. После замены циклоспорина на ММФ у всех пациентов уровень креатинина в сыворотке снижился в среднем на $26 \pm 17\%$. Период наблюдения за пациентами составил 20 ± 8 месяцев после отмены циклоспорина, в течение которых сохранялось указанное выше снижение креатинина и не было эпизодов острого отторжения. Это исследование показывает, что ММФ и преднизолон могут быть использованы как альтернативная эффективная схема иммуносупрессии у пациентов после трансплантации почки, если циклоспорин оказывает нефротоксический эффект [4].

Aleksic и соавторы (2000 г.) также продемонстрировали эффективность частичной замены циклоспорина на ММФ. Двенадцати больным, перенесшим трансплан-

тацию почки и получавшим схему иммуносупрессии, основанную на циклоспорине (плюс азатиоприн и/или стероиды), и имевшим средний уровень креатинина плазмы 2,5 мг% в сроки от 211–1813 дней, начали терапию ММФ в суточной дозе 2 грамма в сутки. Прием азатиоприна прекращали, а дозу циклоспорина медленно снижали до получения минимальной концентрации 70–120 мкг/л. Проводили мониторинг клиренса креатинина, уровня азота мочевины и мочевой кислоты. В результате была отмечена положительная динамика уровня креатинина, который снизился с $2,5 \pm 0,8$ мг/дл до $1,9 \pm 0,6$ мг/дл ($p = 0,04$).

В сроки до 1 года после перехода на ММФ был выявлен один случай отторжения 1b-степени, который купировали увеличением пероральной дозы стероидов с последующей биопсией через 2 недели. Еще один пациент, давший согласие на участие в исследовании, был исключен из-за побочных явлений со стороны желудочно-кишечного тракта, однако в то же самое время у него развился стероидный психоз. Авторы отмечают, что случаев цитомегаловирусной инфекции в этой группе больных не было.

Итак, исследования у реципиентов почечных трансплантатов, получающих лечение ММФ, продемонстрировали положительные результаты в виде улучшения функции трансплантированной почки [5].

Таким образом, накопленные к настоящему времени данные позволяют считать, что ММФ занял прочное место в арсенале современной иммуносупрессии при трансплантации органов, более того, изменение схемы иммуносупрессии с постепенной отменой циклоспорина позволило улучшить отдаленное выживание почечного аллотрансплантата.

Настоящая работа посвящена анализу нашего первого опыта отмены циклоспорина на фоне назначения ММФ.

Материалы и методы

У 20 реципиентов почечных аллотрансплантатов (14 мужчин и 6 женщин, возраст от 11 до 58 лет, средний возраст $26,2 \pm 16,2$ года) было осуществлено постепенное снижение дозы циклоспорина ниже терапевтического диапазона на фоне назначения ММФ.

Доза ММФ у взрослых составляла 2 г/сут, у детей – 1200 мг/м² в сутки. Срок после трансплантации у больных к началу снижения дозы циклоспорина колебался от 0,5 до 96 месяцев ($23,8 \pm 18,8$ мес.). Всем больным перед началом отмены циклоспорина выполнялась пункционная биопсия трансплантата (далее по тексту «исходная биопсия»). Результаты этих биопсий сведены в табл. 1.

Шести больным отмена циклоспорина проводилась с целью профилактики развития хронической нефропатии трансплантата (при исходной биопсии патологии не выявлено), двум больным – в связи с острой циклоспориновой нефротоксичностью при нормальных концентрациях препарата, у десяти больных к моменту принятия решения уже имелась хроническая нефропатия: у 7 больных – 1-й ст. (в том числе у одного

больного в сочетании с острым отторжением 1b), у 3 больных – 2-й ст. (в том числе у одного больного в сочетании с острым отторжением 1b). У одного больного при исходной биопсии было выявлено субклиническое острое отторжение 1a. Еще у одного больного единственной патологией при исходной биопсии был склероз артерий (cv1).

Восемь больных на момент принятия решения уже получали ММФ, и снижение дозы циклоспорина проводилось поэтапно, с тем чтобы полностью отменить препарат за 9–12 месяцев. У 12 больных снижению дозы циклоспорина предшествовало постепенное введение ММФ. Снижение дозы циклоспорина начиналось, после того как была установлена хорошая переносимость ММФ.

Срок наблюдения за больными после более чем двукратного снижения дозы циклоспорина составил от 10 до 24 месяцев ($14,6 \pm 3,4$ мес.).

Результаты и обсуждение

У пяти больных циклоспорин был отменен полностью. У двух из них в течение трех месяцев после отмены циклоспорина развилось острое отторжение (1a и 1b), полностью подавленное возвратом прежней дозы циклоспорина.

У одного из двух больных с острым отторжением после отмены циклоспорина при исходной биопсии была обнаружена хроническая трансплантационная нефропатия 2-й степени, имелись клинические признаки избыточной иммуносупрессии – ухудшение течения HCV-инфекции (трансаминазы в 10 раз выше нормы). После замены циклоспорина на ММФ отмечено снижение креатинина с 340 до 110 мкмоль/л, нормализация трансаминаз. Через два месяца приема ММФ развилась тяжелая диарея, вероятно, приведшая к снижению биодоступности иммуносупрессантов и развитию отторжения, проявившего себя двукратным увеличением протеинурии и креатининемии и подтвержденного морфологически (1b). После отмены ММФ и возврата прежней дозы циклоспорина диарея была купирована, уровень креатинина поднялся до 280 мкмоль/л, начался рост трансаминаз. В настоящее время этот больной принимает ММФ в течение 3–4 недель до появления первых признаков диареи, затем прекращает прием ММФ и начинает прием циклоспорина. После полной нормализации

Таблица 1
Результаты исходных биопсий (Banff-97)

Морфологический диагноз	Количество больных	Срок после трансплантации, дни			
		min	max	M	m
Норма	6	1110	186	429	342,9
CAN 1	6	1372	291	846	437,4
CAN 2	2	2611	1130	1870,5	1047,2
Острая CcA-нефротоксичность	2	363	14	188,5	246,8
AR 1b + CAN 1	1	628			
AR 1b + CAN 2	1	2372			
AR 1a	1	1314			
Артериосклероз 1-й ст.	1	446			

Примечание. AR – острое отторжение; CAN – chronic allograft nephropathy; CcA – циклоспорин A; M – среднее арифметическое; m – стандартное отклонение.

Таблица 2

Динамика некоторых показателей после уменьшения дозы циклоспорина вдвое и более

	Доза циклоспорина 100%, M ± m	Доза циклоспорина <50%, M ± m	t	p	
Доза ММФ (мг/сут)	1803,57 ± 400,89	1739,13 ± 286,82	0,87	Ns	
Доза CsA (мг/сут)	293,66 ± 108,35	70,44 ± 56,65	13,44	<0,001	
Концентрация циклоспорина А	T ₀ (нг/мл)	100,36 ± 48,84	28,41 ± 28,07	9,14	<0,001
	T ₁ (нг/мл)	653,63 ± 312,41	401 ± 93,34	6,49	<0,001
	T ₂ (нг/мл)	512,35 ± 175,93	214,33 ± 37,21	14,54	<0,001
	AUC (нг/мл/ч)	3610,25 ± 1514,44	1680,03 ± 553,42	13,7	<0,001
Мочевина крови (мг%)	72,15 ± 27,75	57,35 ± 44,8	1,51	Ns	
Креатинин крови (мг%)	2,09 ± 0,68	1,71 ± 0,9	1,89	Ns	
Клубочковая фильтрация (мл/мин)	50,86 ± 20,36	67,1 ± 33,8	2,20	<0,05	
RI, междолевые артерии	0,67 ± 0,07	0,65 ± 0,05	1,55	Ns	
RI, дуговые артерии	0,65 ± 0,04	0,65 ± 0,05	0,00	Ns	
RI, почечная артерия	0,73 ± 0,06	0,7 ± 0,1	1,37	Ns	
Протеинурия (мг/сут)	337,04 ± 292,14	326,73 ± 537,05	0,09	Ns	
Систолическое АД дома	135,74 ± 12,07	122,4 ± 14,53	4,05	<0,01	
Диастолическое АД дома	85,45 ± 8,94	76,09 ± 8,39	4,69	<0,001	
Систолическое АД на приеме	133,48 ± 12,86	121,74 ± 12,93	3,87	<0,01	
Диастолическое АД на приеме	83,73 ± 9,09	75,65 ± 6,62	4,77	<0,001	

Примечание. Ns – статистически недостоверно.

стула, происходящей в течение 2–3 недель, циклоспорин отменяется, и вновь назначается ММФ. В результате такого маневра удается поддерживать уровень трансаминаз, не более чем в 2 раза превышающих норму, креатинин колеблется от 120 мкмоль/л (на ММФ) до 300 мкмоль/л (на циклоспорине).

У другого больного исходная биопсия не выявила патологии, признаков избыточной иммуносупрессии не было. Острое отторжение проявило себя повышением креатинина на 20% от базового уровня, было подтверждено морфологически и было подавлено назначением прежней дозы циклоспорина в течение 2 месяцев. Впоследствии дозу циклоспорина удалось снизить более чем в два раза.

Особого внимания заслуживают трое больных с острым отторжением при исходной биопсии – у двух больных в сочетании с хронической нефропатией, у одного – в чистом виде. Указанная патология была обнаружена на фоне трехкомпонентной иммуносупрессии (CsA + азатиоприн + стероиды) в отдаленные сроки после трансплантации (1,7; 3,6 и 6,5 года). Мы расценили наличие острого отторжения как свидетельство в пользу невозможности эффективного подавления циклоспорином аллоиммунной реактивности у этих больных. Во всех случаях сначала была постепенно введена полная доза селлсепта. У больного с изолированным острым отторжением поводом для снижения дозы и отмены циклоспорина была резистентная к терапии дислипидемия, ишемическая болезнь сердца и артериальная гипертензия. У больных с комбинацией острого отторжения и хронической нефропатии снижение дозы циклоспорина было начато после появления клинических признаков избыточности иммуносупрессии (частые респираторные инфекции у обоих больных, а также генитальный кондиломатоз у женщины). После более чем двукратного снижения дозы клинические признаки избыточности иммуносупрессии значительно уменьшились.

Эффективность наших манипуляций с иммуносупрессией оценивалась по сопоставлению у больных таких параметров, как креатинин и мочевина крови, протеинурия, ультрасонография трансплантата с доплерометрией внутрипочечного кровотока, артериальная гипертензия, многократно зафиксированных до начала снижения дозы циклоспорина и после того, как доза была снижена более чем на 50%. Эти сведения приведены в табл. 2. Статистическая обработка проводилась по методу Стьюдента.

Обнаружены положительные изменения практически по всем контролируемым характеристикам:

снизились мочевина и креатинин крови, снизились индексы резистивности по междолевым и почечным артериям, статистически достоверным было только увеличение скорости клубочковой фильтрации и снижение артериального давления.

Заключение

Постепенная отмена циклоспорина на фоне назначения селлсепта позволяет улучшить функцию трансплантата и снизить артериальное давление у пациента. Снижение артериального давления позволяет рассчитывать на значительное улучшение отдаленного выживания трансплантатов, поскольку известно, какую роль играет артериальная гипертензия в патогенезе хронической трансплантационной нефропатии. Кроме того, снижение артериального давления позволяет рассчитывать на снижение частоты сердечно-сосудистых заболеваний – основной причины смерти больных с функционирующим трансплантатом.

Наш первый опыт, а также данные литературы свидетельствуют о безопасности такого маневра при условии тщательного наблюдения за больными: потеря трансплантатов не было ни у нас, ни у других авторов, при развитии острого отторжения оно быстро подвергается обратному развитию после назначения циклоспорина. Острое отторжение может развиваться либо на этапе снижения дозы циклоспорина, либо в течение первых трех месяцев после полной отмены циклоспорина. Следовательно, условием безопасности такого маневра в иммуносупрессии является тщательное наблюдение за больным в течение этого срока.

Литература

1. Mycophenolate Mofetil in renal transplantation: 3-year results from the placebo-controlled trial. European Mycophenolate Mofetil Cooperative Study Group. Transplantation 1999; 68: 391.
2. Ojo A.O., Meier-Kriesche H.U., Hanson J.A., Leichtman A.B., Cibrik D., Magee J.C., Wolfe R.A., Agodoa L.Y., Kaplan B. MMF reduces late renal allograft loss independently of acute rejection. Transplantation 2000;

69: 2405–2409.

3. *Schrama Y, Joles J, van Tol A, Boer P, Koomas H, Hen R.* Conversion to MMF according with gradual cyclosporine withdrawal in stable kidney graft recipients. *Transplantation* 2000; 69: 376–383.

4. *Houde I, Isebring P, Boucher D, Noel R, Lachanche J.-G.* Mycophenolate Mofetil – alternative to cyclosporine A for long-term

immunosuppression in kidney transplantation. *Transplantation* 2000; 70: 1251–1253.

5. *Aleksic I, Baryalei M, Pieske B, Scorn B, Strauch J, Sorbu H, Dalicbau H.* The amelioration of a deteriorated function of allografted kidneys in patients receiving Mycophenolate Mofetil and small doses of Sandimmune. *Transplantation*; 70: 1586–1590.

Диастолическая дисфункция у больных с хронической почечной недостаточностью

А.М. Шутов

Кафедра госпитальной терапии Ульяновского государственного университета

Diastolic dysfunction in patients with chronic renal failure

A.M. Shutov

Ключевые слова: хроническая почечная недостаточность, диастолическая дисфункция, диастолическая сердечная недостаточность, доплер-эхокардиография.

В работе представлены данные об эпидемиологии, патофизиологии, диагностике и лечении диастолической дисфункции левого желудочка у больных с хронической почечной недостаточностью (ХПН). В клинике основным методом диагностики диастолической дисфункции является доплер-эхокардиография, по данным которой выделяют три типа патологического трансмитрального спектра: тип нарушенной релаксации, псевдонормальный, рестриктивный. У больных с ХПН преобладает тип нарушенной релаксации. Дифференциальная диагностика нормального и псевдонормального типов трансмитрального кровотока затруднена, в частности проба Вальсальвы у больных с ХПН недостаточно информативна. Крупных проспективных контролируемых исследований по лечению диастолической сердечной недостаточности пока нет. Современная терапия заключается в ликвидации симптомов диастолической сердечной недостаточности и воздействии на патологию, которая приводит к диастолической дисфункции.

Epidemiology, pathophysiology, diagnosis and treatment of diastolic dysfunction of the left ventricular in patients with chronic renal failure (CRF) are reviewed. Doppler echocardiography is the main method of diagnostic of the diastolic dysfunction. There are three abnormal patterns of transmitral flow: (i) impaired relaxation, (ii) pseudonormalization, (iii) restricted filling. The impaired relaxation is the most common pattern of the transmitral flow in the CRF patients. The doppler indexes frequently lead to an incorrect diagnosis because it is difficult to distinguish normal and pseudonormal transmitral flow. Valsalva maneuver is not effective in CRF patients. The evidence-based guidelines for management of diastolic heart failure are absent. The general approach to the treatment of diastolic heart failure is to reduce symptoms of heart failure and treatment of disease that causes diastolic dysfunction.

Заболевания сердца и сосудов являются основной причиной смерти больных с хронической почечной недостаточностью (ХПН), получающих заместительную терапию [55]. Наличие хронической сердечной недостаточности (ХСН) на старте заместительной терапии увеличивает риск смерти на 93% независимо от возраста, наличия ишемической болезни сердца и сахарного диабета [36]. При этом нефрологам хорошо известна относительно невысокая частота систолической дисфункции, которая в клинической практике определяется по показателям фракции выброса (ФВ) и фракции укорочения [14, 17, 28].

Между тем, к сердечной недостаточности может

приводить не только систолическая, но и диастолическая дисфункция [2, 9, 33]. Более того, прогрессирование и прогноз ХСН переменны и часто не коррелируют с состоянием систолической функции [43]. Функциональный класс ХСН более тесно связан с параметрами диастолического наполнения [44]. Одной из основных причин развития диастолической дисфункции является гипертрофия левого желудочка [57], которая, как показало крупное исследование CREATE trial, проведенное в 100 нефрологических центрах Европы, Азии и Латинской Америки, наблюдается у половины додиализных больных с клиренсом креатинина 15–35 мл/мин [31].

Адрес для переписки: 432063, г. Ульяновск-63, а/я 4595

Телефон: (8422) 25-04-62

E-mail: amsbu@mail.ru